Tipps für eine anhaltende Blüte im Wildstauden-Garten

Viele Wildstauden haben eher kurze Blütezeiten und bei vielen liegt die Hauptblüte im Frühsommer. Damit auch vorher und nachher noch was blüht, empfehlen wir bei der Planung und Pflege von Wildstauden-Beeten folgende Punkte zu beachten:

• **Frühblüher** • **Spätblüher** • **Dauerblüher** • **Sommerschnitt**

Tipp: Integrieren Sie 1-3 Arten aus jeder Gruppe in Ihre Planung.

Frühblüher

	Deutscher Name	Höhe	Blüte	Licht
Allium ursinum	Bärlauch	20-40	weiss V-VI	☉-●
Anemone nemorosa	Buschwindröschen	10-20	weiss III-V	☉-●
Anemone ranunculoides	Gelbes Windröschen	10-20	gelb IV-V	☉-●
Anthyllis vulneraria	Gemeiner Wundklee	10-30	gelb IV-V	☼
Helleborus foetidus	Stinkender Nieswurz	30-60	grün III-IV	☉-●
Lathyrus vernus	Frühlingsplatterbse	20-50	violettrot IV-V	☉-●
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	40-100	helllila IV-VI	☉-●
Potentilla verna	Frühlingsfingerkraut	5-15	gelb III-V	☼
Primula veris	Frühlingsschlüsselblume	10-25	gelb III-IV	☼-☉
Silene dioica	Rote Lichtnelke	30-80	rot IV-VI	☉
Silene flos-cuculi	Kuckuckslichtnelke	30-80	rosa IV-VI	☼-☉
Viola odorata	Duftveilchen	10-15	violett III-IV	☉

Spätblüher

	Deutscher Name	Höhe	Blüte	Licht
Aster amellus	Kalkaster	20-50	VIII-X	☼-☉
Bupleurum falcatum	Sichelblättriges Hasenohr	30-70	gelb VII-X	☼-☉
Campanula trachelium	Nesselblätt. Glockenblume	50-100	violett VII-IX	☉-●
Daucus carota	Wilde Möhre	30-90	weiss VI-IX	☼
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	100-200	lila VII-VIII	☼
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	50-150	Rosa VII-IX	☼-☉
Filipendula ulmaria	Mädesüss	50-150	weiss VII-IX	☼-☉
Lythrum salicaria	Blutweiderich	40-120	purpur VII-IX	☼-☉
Origanum vulgare	Wilder Oregano	30-40	rosalila VI-IX	☼
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	50-150	VII-IX	☼-☉
Salvia glutinosa	Klebriger Salbei	40-100	gelb VII-X	☉-●
Solidago virgaurea	Gemeine Goldrute	30-100	gelb VII-VIII	☉
Stachys officinalis	Gewöhnliche Betonie	30-70	purpur VI-VIII	☼-☉
Succisa pratensis	Teufelsabbiss	30-90	lila VII-IX	☉

Dauerblüher

	Deutscher Name	Höhe	Blüte	Licht
Campanula rotundifolia	Rundblätt. Glockenblume	10-30	blau-violett V-X	☼-☉
Cichorium intybus	Wegwarte	40-120	blau VII-X	☼
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	5-15	lila V-X	☼-☉
Helianthemum numm.	Sonnenröschen	10-30	gelb V-X	☼
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut	20-60	gelb VI-IX	☼
Malva-Arten	Malva div.	30-120	rosa VI-IX	☼-☉
Scabiosa columbaria	Taubenskabiose	20-80	lila V-IX	☼

Sommerschnitt

Diese Stauden können unmittelbar nach der Blütezeit zurückgeschnitten werden (ca. ende Juni), bevor die Samenbildung einsetzt. Sie treiben dann erneut aus und erfreuen meist mit einer zweiten Blüte später im Jahr. Dies geschieht anhand des „Remontierschnitts“: Die ganze Pflanze (Laub und Stängel) auf ca. 5cm runterschneiden.

Bei folgenden Arten empfiehlt sich ein Sommerschnitt (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

	Deutscher Name	Höhe	Blüte	Licht
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	30-60	weiss VI (-X)	☼
Buphthalmum salicifolium	Ochsenauge	20-50	gelb VI (-IX)	☼-●
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume	30-90	purpur VI (-IX)	☼
Centaurea scabiosa	Skabiosenflockenblume	40-100	purpur VI (-IX)	☼
Dianthus carthusianorum	Karthäusernelke	20-40	purpur VI (-IX)	☼
Lotus corniculatus	Hornklee	10-30	gelb V (-IX)	☼
Prunella grandiflora	Grosse Braunelle	15-40	violett VI (-X)	☼-●
Salvia pratensis	Wiesensalbei	30-70	blau V (-IX)	☼
Stachys recta	Aufrechter Ziest	30-60	hellgelb VI (-X)	☼
Silene flos-cuculi	Kuckuckslichtnelke	30-80	rosa V (-VII)	☼-●
Silene vulgaris	Gemeines Leimkraut	30-50	weiss VI (-IX)	☼

Ob es zu einer zweiten Blüte kommt oder nicht ist teilweise auch standort- temperatur- und wetterabhängig. Probieren Sie es aus!

Häufig lohnt sich ein Sommerschnitt aber so oder so: Bei einigen Pflanzen wird im Sommer das Laub nach der Blüte unansehnlich, häufig auch bedingt durch Hitze und Trockenheit. Idealerweise geschieht der Rückschnitt in einer etwas kühleren/regnerischen Woche. Die Stauden treiben erneut aus und schon bald zielt frisches Grün den Garten. Ausserdem passen die Stauden ihren Neuaustrieb den trocken-heissen Bedingungen des Sommers durch etwas kleinere Blätter an, dadurch verdunsten sie weniger Wasser und sind folglich weniger durstig.

Bei folgenden Arten empfiehlt sich ein Sommerschnitt, auch wenn es „nur“ zum Laubaustrieb und zu keiner zweiten Blüte kommen sollte:

Aconitum vulparia, Alchemilla-Arten, Campanula-Arten, Dianthus-Arten, Digitalis lutea, Euphorbia-Arten, Galium-Arten, Geranium-Arten, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Onobrychis viciifolia, Saponaria-Arten, Symphythum officinalis, Tanacetum-Arten, Teucrium-Arten, Thymus-Arten, Verbascum nigrum, Veronica-Arten

Tipp für die Artenvielfalt: Stellenweise Samenstände trotz allem stehen lassen, sie dienen Vögeln auch im Sommer als Nahrung.